

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- **Impirfluxam** pertenece al grupo químico de las Pirazolcarboxamida y **Tebuconazol** al grupo químico de los Triazoles.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. **Durante la preparación**, usar guantes impermeables, botas de goma impermeables, delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro. **Durante la aplicación**, usar guantes impermeables, botas de goma impermeables, overol impermeable, antiparras, máscara con filtro.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento, ni con calor excesivo.
- No comer, fumar, ni beber mientras trabaje con este producto.
- Lávese con agua limpia después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo separada del resto de la ropa.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.

**Síntomas de intoxicación:** La ingestión del producto puede provocar síntomas generales como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza y mareos. El contacto directo con los ojos puede provocar enrojecimiento y molestias.

Primeros Auxilios

En caso de **“contacto con los ojos”**: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. De ser necesario, buscar atención medica de inmediato.

En caso de **“inhalación”**: Traslade a la persona afectada a una zona fresca, seca y aireada. Vigile la respiración. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Obtenga atención médica si es necesario. Si se producen vómitos, mantener la cabeza baja para que el contenido del estómago no llegue a los pulmones. En caso de **“contacto con la piel”** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Obtenga atención médica si persiste la irritación. Lavar la ropa antes de volver a usar.

En caso de **“ingestión”**: **NO INDUCIR EL VOMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Obtenga atención médica para tratamiento inmediato. Solicitar atención médica. Si se producen vómitos, mantener la cabeza baja para que el contenido del estómago no llegue a los pulmones. Administrar oxígeno si tiene dificultad para respirar. Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. No utilizar el método boca a boca.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**Tratamiento médico de emergencia:** Realice tratamiento sintomático y de sostén según se presenten los síntomas.

**Riesgos Ambientales:** EXCALIA MAX® es LIGERAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, moderadamente tóxico para peces y dafnias, y ligeramente tóxico a aves.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.**

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.**

**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”.**

**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.**

**“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DE CUMPLIDO EL PERÍODO DE REINGRESO”.**

**“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”.**

**“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.**

**Procedimiento de Triple Lavado:** Una vez vacío el envase, adicione agua limpia al envase hasta ¼ de su capacidad, cierre el envase y agite durante 30 segundos, vaciar el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantener el envase en posición de descarga por 30 segundos, repetir este procedimiento 3 veces. Luego perforo el envase para evitar su reutilización.

**Teléfonos de Emergencia:** Sumitomo Chemical Chile S.A.: (56)228350500 (horas de oficina)

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56)226353800 (**Atención las 24 horas**)

CIITUC Químico (Emergencia química): (56)222473600

# EXCALIA MAX®

## FUNGICIDA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Fungicida con acción sistémica y translaminar, para el control de enfermedades indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

\*Impirfluxam .....6% p/v (5,61% p/p, 60 g/L)

\*\*Tebuconazol.....20% p/v (18,69% p/p, 200 g/L)

Coformulantes, c.s.p. ....100% p/v (100%p/p, 1.070 g/L)

\* 3-(Difluorometil)-N-[(R)-2,3-dihidro-1,1,3-trimetil-1H-inden-4-il]-1-

metilpirazol-4-carboxamida

\*\***(RS)**-1-p--clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 20067

Contenido neto: ..... Litro

N° Lote:

Fecha Fabricación:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

Sumitomo Chemical Brasil Industria Química

Avenida Wilson Camurça N° 2138 Distrito Industrial,

Maracanaú, Ceará, Brasil

Importado y Distribuido por:

 SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.

Av. Kennedy 5735, Of 1601, Torre Poniente

Las Condes, Santiago-Chile

Fono: (56) 22835 0500

® Marca Registrada Sumitomo Chemical Co., LTD

INSTRUCCIONES DE USO

**EXCALIA MAX®** con acción sistémica y translaminar con prolongado efecto residual. La mezcla de dos ingredientes activos con diferente modo de acción (Impirfluxam inhibe la enzima succinato deshidrogenasa y Tebuconazol inhibe la síntesis del ergosterol de los hongos limitando su crecimiento y esporulación), otorga efectivo control de las enfermedades indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso

| Cultivo                                                                                              | Enfermedad                                                                                                                                                   | Dosis (mL/ha) | Observaciones (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerezo,<br>Duraznero,<br>Duraznero<br>conservero,<br>Ciruelo,<br>Nectarino,<br>Damasco y<br>Almendro | Tizón de la flor<br>( <i>Botrytis cinerea</i> ,<br><i>Monilia fructicola</i> ,<br><i>Monilia laxa</i> )<br><i>Botrytis cinerea</i><br><i>Alternaria spp.</i> | 600 – 700     | Realizar una aplicación en una estrategia de control preventivo, en floración, desde estado de botón o pétalos expuestos hasta plena floración. Usar la dosis mayor en caso de tener alta presión de <i>alternaria spp.</i> o con presencia de condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades. Se sugiere considerar un volumen de agua que permita una óptima cobertura, en floración usualmente entre 1.000 y 1.200 L/ha, dependiendo del tamaño de las plantas. Realizar no más de una aplicación por temporada. |
| Manzano                                                                                              | Venturia<br>( <i>Venturia<br/>inaequalis</i> )                                                                                                               | 350           | Aplicar en forma preventiva desde puntas verdes, dirigido al follaje, repitiendo según condiciones de infección. Utilizar un volumen de agua de 1500 L/ha. Aplicar un máximo de 3 veces por temporada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(\*)Respetar las recomendaciones en Manejo de Resistencia

**Preparación de la Mezcla:** Llenar el estanque con agua hasta la mitad y con el agitador en funcionamiento, adicionar lentamente la cantidad necesaria de **EXCALIA MAX®**; luego completar con agua al volumen deseado. Mantener el agitador funcionando hasta que finalice la aplicación.

**Incompatibilidad:** No se conocen incompatibilidades específicas.

**Compatibilidad:** EXCALIA MAX® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de los agroquímicos. Antes de realizar una mezcla se recomienda realizar una prueba a pequeña escala. En caso de dudas, consultar a nuestro Departamento técnico.

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos indicados cuando es utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso señaladas en etiqueta.

**Período de Carencia (días):** Manzana: 50; Cerezo, Durazno, Durazno conservero, Ciruelo, Nectarino, Damasco y Almendro: 70. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** 24 horas para personas, asegurando que el depósito aplicado se haya secado completamente. Para animales no aplica dado que **EXCALIA MAX®** no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Manejo de Resistencia:

**EXCALIA MAX® debe ser aplicado** según las instrucciones de uso de esta etiqueta, alternando siempre con fungicidas de diferente modo de acción, dentro de un programa de manejo anti-resistencia. De acuerdo a clasificación FRAC; Tebuconazol pertenece al **Grupo G1** e Impirfluxam al **Grupo C2**.

**Nota al Comprador:** Las recomendaciones de uso, así como la información de esta etiqueta, son el resultado de rigurosos y amplios estudios y pruebas. Sin embargo, numerosos factores más allá de nuestro control (preparación de las mezclas, condiciones climáticas, equipos de pulverización, etc.) pueden afectar el uso. La responsabilidad sobre daños producidos por un mal uso del producto o por aplicaciones diferentes a las recomendadas en la etiqueta son de absoluta responsabilidad del usuario. La compañía garantiza la calidad de la formulación, porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

V002-05-2026



# CUIDADO

